

Technique d'injection



Comment s'injecter FRAGMIN à partir d'une fiole à doses multiples

Ce qu'il vous faut :

- ✓ Une nouvelle seringue munie d'une aiguille
- ✓ Des tampons imbibés d'alcool
- ✓ Un tampon d'ouate
- ✓ Un contenant approuvé pour seringues usagées



ÉTAPE 1

Lavez-vous les mains.



ÉTAPE 2

La première fois que vous utilisez la fiole, enlevez le capuchon de plastique recouvrant le dessus. Nettoyez toujours le bouchon en caoutchouc à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool avant de prélever FRAGMIN.



ÉTAPE 3

Retirez le piston jusqu'à la marque correspondant à votre dose pour remplir la seringue d'air. La quantité d'air dans la seringue devrait être à peu près égale au volume de FRAGMIN qui vous a été prescrit.



ÉTAPE 4

Enfoncez l'aiguille à travers le bouchon de caoutchouc de la fiole et injectez l'air de la seringue dans la fiole.



ÉTAPE 5

L'aiguille étant toujours dans la fiole, renversez la fiole et la seringue.

Pour prélever la quantité nécessaire de FRAGMIN, retirez le piston en maintenant le bout de l'aiguille dans la solution (pour éviter de faire entrer des bulles d'air).



ÉTAPE 6

Continuez de retirer le piston jusqu'à ce que le haut du piston ait dépassé un peu la marque correspondant au volume désiré sur la seringue (en d'autres termes, prélevez-en un peu plus que ce qu'il vous faut).



ÉTAPE 7

En maintenant la fiole à l'envers, avec l'aiguille pointée vers le haut, tapotez la seringue du bout des doigts ou donnez-lui une légère « pichenotte » pour que les bulles remontent jusqu'en haut de la seringue.



ÉTAPE 8

Pour expulser les bulles d'air et l'excédent de FRAGMIN dans la fiole, enfoncez le piston lentement jusqu'à ce que le dessus noir du piston soit à la hauteur de votre dose.



ÉTAPE 9

Retirez l'aiguille de la fiole. Si vous n'êtes pas prêt à procéder immédiatement à l'injection, remplacez le capuchon de l'aiguille sans toucher celle-ci.



ÉTAPE 10

Choisissez un point d'injection.

Il est préférable d'injecter le médicament dans le bas de l'abdomen. On peut aussi injecter FRAGMIN dans le côté de la cuisse, à condition de s'assurer de ne pas l'injecter dans les muscles. Pour chaque injection, choisissez un endroit différent de l'abdomen ou de la cuisse, tel qu'illustré.



ÉTAPE 11

Nettoyez le point d'injection.

Nettoyez le point d'injection avec un tampon imbibé d'alcool et attendez que la peau soit sèche.



ÉTAPE 12

Pincez la peau pour former un bourrelet. Avec le pouce et l'index, pincez la peau de manière à former un bourrelet dans lequel vous insérerez l'aiguille. **Vous devez tenir ainsi la peau durant toute l'injection.**



ÉTAPE 13

Administrez FRAGMIN. De la main droite si vous êtes droitier (de la gauche si vous êtes gaucher), tenez la seringue comme un crayon entre le pouce et le majeur. Insérez l'aiguille à la verticale dans le bourrelet de peau aussi profondément que possible. Une fois l'aiguille insérée, ne la déplacez pas.



Si vous vous injectez le produit vous-même, poussez sur le piston avec l'index. **Si vous l'injectez à quelqu'un d'autre,** servez-vous du pouce pour pousser sur le piston.

ÉTAPE 14

Après l'injection de FRAGMIN, retirez l'aiguille, puis relâchez la peau. Appliquez un tampon d'ouate au point d'injection au moins 5 à 10 secondes. Afin d'éviter les ecchymoses (bleus), ne frottez pas la peau. Jetez la seringue usagée de façon sécuritaire dans un contenant approuvé, hors de la portée des enfants.



Utilisez une nouvelle seringue à chaque injection. Ne conservez pas les seringues déjà utilisées pour un usage ultérieur, même si vous n'avez pas injecté toute la solution. Jetez la solution qui reste.

L'alcool benzylique pouvant pénétrer le placenta, la préparation à 25 000 UI de FRAGMIN en fiole à doses multiples de 3,8 mL ne doit pas être utilisée chez la femme enceinte.

Les préparations contenant de l'alcool benzylique doivent être utilisées avec prudence chez les enfants.

FRAGMIN sert à prévenir la coagulation du sang lors d'une chirurgie, à traiter la formation de caillots sanguins dans les veines profondes, à traiter la formation de caillots symptomatiques pour prévenir la récurrence des caillots chez les patients atteints de cancer, à traiter les maladies coronariennes instables, à prévenir la coagulation chez les patients à risque présentant une mobilité réduite au cours d'une affection aiguë et à prévenir la coagulation du sang dans le matériel de dialyse et de filtration du sang utilisé en cas d'insuffisance rénale aiguë ou de maladie rénale chronique.

Il faut suivre attentivement les directives de votre médecin ou de votre infirmière. Donnez-vous les injections prescrites pendant la durée de traitement indiquée par le médecin.

Pendant votre traitement par FRAGMIN, ne prenez aucun autre médicament que ceux qui vous sont prescrits par votre médecin. Certains médicaments peuvent intensifier l'effet anticoagulant (éclaircissement du sang) de FRAGMIN. Il importe donc d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez.

On administre FRAGMIN en l'injectant sous la peau (par voie sous-cutanée); il ne faut pas l'injecter dans un muscle (par voie intramusculaire).

Cessez de prendre FRAGMIN et communiquez avec votre médecin dans les cas suivants : importante coloration, douleur ou ecchymose autour du point d'injection; ecchymose sans cause apparente; saignement de nez; saignement de la bouche, des gencives, de l'anus, du vagin ou dans l'abdomen; saignement au point d'injection et/ou des plaies chirurgicales; réaction allergique; présence de sang dans les urines; accident vasculaire cérébral (saignement à l'intérieur du cerveau). En cas d'effet inattendu lors de la prise de FRAGMIN, veuillez communiquer immédiatement avec votre médecin ou votre pharmacien.

Conservez la fiole à doses multiples à la température ambiante (de 15 à 30 °C). La fiole doit être utilisée dans les 2 semaines qui suivent sa perforation initiale.

Veuillez consulter le feuillet de renseignements pour le consommateur contenu dans l'emballage du produit pour de l'information complète sur l'innocuité du produit et l'administration.



FRAGMIN, M.D. de Pfizer Health AB,
Pfizer Canada SRI, licencié.
© 2022 Pfizer Canada SRI, Kirkland
(Québec) H9J 2M5

PP-FRA-CAN-0276-FR

