

كيف تعطي نفسك حقنة FRAGMIN باستخدام حقنة سليمة معبأة مسبقاً

لا تحاول نزع الحقنة من عبوة المادة السائلة بأصابعك.

اتبع التعليمات لكي تتعرف على طريقة التعامل الصحيح كما هو مبين في الخطوات من ١ إلى ٣، وإلا من المحتمل أن تنفلت آلية سلامة الحقنة وتصبح الحقنة غير قابلة للاستخدام.

خطوة ١

اقشر العبوة الورقية كلياً عن عبوة المادة السائلة.



خطوة ٢

أف العبوة بحيث يكون الجانب المفتوح مواجهاً للأسفل من ثلاثة إلى خمسة سنتيمترات فوق سطح مستوي كالطاوله مثلاً.



خطوة ٣

الإخراج المحقنة، اسحب الجوانب من وسط عبوة المادة السائلة لتوسيع فجوة عبوة المادة السائلة. وهذا يؤدي إلى خروج المحقنة من العبوة.



خطوة ٤

أغسل يديك.



خطوة ٥

حدّد موضع الحقن.

الموضع المفضل للحقن هو الجزء الأسفل من البطن. يمكن أيضاً حقن FRAGMIN في جانب الفخذ، مع مراعاة عدم الحقن في الألياف العضلية. حدّد موضع مختلف على البطن أو الفخذ لكل حقنة لاحقة كما هو مبين في الشكل.



خطوة ٦

عقّم موضع الحقن.

امسح المنطقة المحددة للحقن بقطنة مبللة بالكحول وانتظر حتى تجف.



خطوة ٧

امسك الحقنة من وسطها واستعد لحقن جرعة FRAGMIN.

لا تلمس مشابك تفعيل وقاية الإبرة في أي وقت أثناء الاستخدام، فقد يؤدي ذلك إلى إنفلات آلية سلامة الإبرة ويسبب ارتداد الإبرة قبل إعطاء الحقنة. وهذا سيجعل الحقنة غير قابلة للاستخدام.



خطوة ٨

انزع غلاف الإبرة.

يرجى منك أن تلاحظ بأنك تحتاج إلى سحب غلاف الإبرة بقوة لكي تتمكن من انتزاعه. لضمان الحقن التام، لا تسحب أي فقاعات هوائية صغيرة من الحقنة المعبأة مسبقاً قبل الحقن.



خطوة ٩

امسك الجلد موضع الحقن.

يجب إدخال الإبرة في الجلد موضع الحقن المقبوض بالإبهام وأصبع السبابة. يجب تثبيت الجلد المقبوض موضع الحقن خلال عملية الحقن.



خطوة ١٠

احقن دواء FRAGMIN.

باستخدام اليد المسيطرة، ثبتت المحقنة كالقلم بين الإبهام وأصبع الوسطى. ادخل الإبرة عمودياً في الجلد المقبوض موضع الحقن إلى أقصى حد تصل إليه. لا تحرك الإبرة بعدما يتم إدخالها.

إذا كنت تحقن نفسك ذاتياً، اضغط

على السداة بأصبع السبابة، وإذا كنت تحقن شخصاً آخر، استخدم الإبهام للضغط على السداة.



خطوة ١١

انزع الإبرة وقم بتنشيط وافي الإبرة.

عندما تحقن جميع محتويات المحقنة، انزع الإبرة مع تثبيت الجلد المقبوض موضع الحقن ودفع السداة للأسفل، ثم اترك الجلد.

اترك السداة ودع المحقنة تتحرك للأعلى داخل الجهاز حتى يتم تأمين

الإبرة كلياً. لن يتم تنشيط وافي الإبرة حتى يتم إعطاء الجرعة بأكملها.



خطوة ١٢

بعد إعطاء FRAGMIN.

اضغط على موضع الحقن بقطعة قطن لمدة ٥ إلى ١٠ ثوانٍ أو أكثر. لتجنب إمرار الجلد، لا تفرك موضع الحقن.

تخلص من المحقنة المستعملة بإلقائها في حاوية مخصصة. تأكد من حفظها في مكان بعيد عن متناول الأطفال.



يستخدم FRAGMIN لمنع تجلط الدم (التخثر) عند إجراء عملية جراحية، لعلاج تكون تخثرات دموية حادة في الأوردة العميقة، ولعلاج التخثرات الدموية العرضية للحد من تكرار التخثرات عند مرضى السرطان، ولعلاج مرض الشريان التاجي غير المستقر، ولمنع التخثر في الشرايين التي تتعرض للخطر عندما تكون الحركة مقيدة أثناء الإصابة بمرض مزمن، وللدخول من تخثر الدم في أجهزة غسيل الكلى والتصفية المتعلقة بالفشل الكلوي الحاد أو مرض الكلى المزمن.

من الضروري أن تتبع تعليمات الطبيب أو الممرض بعناية. أعط الحقن الموصوفة للمدة الزمنية بأكملها كما يحددها الطبيب.

قد يحتوي وافي الإبرة المطاطي على لاتكس. تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك في الماضي أو حالياً حساسية مفرطة ضد اللاتكس (المطاط الطبيعي).

لا تتناول أي أدوية إلا بوصفة طبية أثناء تناول FRAGMIN. بما أن بعض الأدوية قد تزيد من تأثير FRAGMIN المضاد للتخثر (تأثير أدوية تخفيف الدم مثلاً)، فمن الضروري أن تخبر طبيبك عن أي أدوية تتناولها.

يُعطى FRAGMIN بالحقن تحت سطح الجلد، ويجب ألا يتم حقنه في العضل.

توقف عن تناول FRAGMIN واتصل بالطبيب إذا كنت تعاني من: تغير شديد في اللون أو ألم أو تكدم حول موضع الحقن، أو تكدم دون سبب واضح، أو نزيف في الأنف أو الفم أو اللثة أو البطن أو فتحة الشرج أو المهبل، أو نزيف في موضع الحقن أو موضع الجراحة، أو فرط الحساسية أو خروج دم مع البول، أو إذا كنت تعاني من سكتة دماغية (نزيف في الدماغ). اتصل بالطبيب أو الصيدلي على الفور في حال ظهور أي تأثيرات غير متوقعة أثناء تناول FRAGMIN.

احفظ المحاقن المعبأة مسبقاً في درجة حرارة الغرفة (١٥ إلى ٣٠ درجة مئوية).

يرجى مراجعة نشرة معلومات المستهلك في عبوة المنتج للإطلاع على المعلومات الكاملة حول إعطاء الدواء والسلامة.

تفضل بزيارة Fragmin.ca للعثور على مصادر مفيدة أخرى متاحة عن FRAGMIN باللغتين الإنجليزية والفرنسية

استخدم هذا الرقم للدخول إلى الموقع الإلكتروني: 02430789



FRAGMIN © Pfizer Health AB, owner/ Pfizer Canada ULC, Licensee
© 2022 Pfizer Canada ULC, Kirkland, Quebec H9J 2M5

PP-FRA-CAN-0267-AR

