

نحوه تزریق FRAGMIN به خود با استفاده از سرنگ ایمنی آماده

**سرنگ را با انگشتان خود از بسته‌بندی بلیستر آن بیرون نیاورید.** دستورالعمل مربوط به روش صحیح کار با این وسیله را طبق مراحل 1 تا 3 دنبال کنید؛ در غیر این صورت، مکانیزم ایمنی سوزن ممکن است فعال شود و سرنگ را از کار ببنداند.

### مرحله 1

کاغذ پشت بسته‌بندی بلیستر را به طور کامل جدا کنید.



### مرحله 2

بسته‌بندی را بچرخانید تا قسمت باز آن رو به پایین و در فاصله سه تا پنج سانتی‌متری از یک سطح صاف، مانند میز، قرار گیرد.



### مرحله 3

برای اینکه سرنگ آزاد شود، قسمت وسط بسته‌بندی بلیستر را از دو طرف بکشید تا قسمت گود بلیستر از هم باز شود. با این کار، سرنگ باید طبیعتاً از بلیستر بیرون بیفتد.



### مرحله 4

دست‌های خود را بشویید.



### مرحله 5

محل تزریق را انتخاب کنید.

محل تزریق باید ترجیحاً قسمت تحتانی شکم باشد. FRAGMIN را می‌توان در بغل ران نیز تزریق کرد، البته به شرط آنکه برای جلوگیری از تزریق در بافت عضلانی احتیاط لازم به کار گرفته شود. طبق تصویر برای هر بار تزریق پشت سر هم، محل متفاوتی را در شکم یا ران انتخاب کنید.



### مرحله 6

محل تزریق را تمیز کنید.

محل انتخاب شده برای تزریق را با پنبه الکلی تمیز کنید و اجازه دهید خشک شود.



### مرحله 7

بدنه سرنگ را بگیرید و آن را بلند کنید و سپس برای تزریق دوز FRAGMIN آماده شوید.

در هیچ یک از مراحل استفاده، به گیره‌های فعال‌سازی محافظ سوزن دست نزنید. این کار ممکن است موجب فعال شدن مکانیزم ایمنی سوزن شود و آن را پیش از انجام تزریق جمع کند (به عقب بکشد). در نتیجه سرنگ غیر قابل استفاده خواهد شد.



### مرحله 8

درپوش سوزن را بیرون آورید.

لطفاً توجه داشته باشید که برای بیرون آوردن درپوش سوزن؛ باید آن را محکم بکشید. برای اطمینان از تزریق دوز کامل، به هیچ وجه حباب‌های هوای داخل سرنگ آماده را پیش از تزریق خارج نکنید.



## مرحله 9

قسمتی از پوست را نیشگون بگیرید.

سوزن باید در پوستی که با انگشت شست و انگشت اشاره تا شده است وارد شود. پوست بین دو انگشت باید در کل روند تزریق در همین حالت بماند.



## مرحله 10

FRAGMIN را تزریق کنید.

با دستی که غالب است سرنگ را مثل مداد بین انگشت شست و انگشت وسط خود نگه دارید. سوزن را به صورت عمودی تا آنجا که امکان دارد در پوست بین دو انگشت وارد کنید. سوزن نباید پس از وارد شدن جابجا شود.



اگر دارو را به خود تزریق می‌کنید، پیستون را با انگشت اشاره فشار دهید؛ اگر دارو را به فرد دیگری تزریق می‌کنید، پیستون را با استفاده از انگشت شست فشار دهید.

## مرحله 11

سوزن را بیرون آورید و محافظ سوزن را فعال کنید.

پس از تزریق تمام محتویات سرنگ، سوزن را بیرون آورید اما در عین حال پوست بین دو انگشت را رها نکنید و پیستون را پایین نگه دارید؛ سپس پوست را رها کنید.



پیستون را رها کنید و اجازه دهید سرنگ در داخل دستگاه آن قدر بالا بماند که کل سوزن در محافظ قرار گیرد. تا زمانی که کل دوز دارو تزریق نشود، محافظ سوزن فعال نخواهد شد.

## مرحله 12

پس از اینکه FRAGMIN تزریق شد.

یک تکه پنبه روی محل تزریق قرار دهید و آن را 5 الی 10 ثانیه با بیشتر نگه دارید. برای پیشگیری از کبودی پوست، محل تزریق را نمالید.



سرنگ استفاده شده را در یک ظرف مورد تأیید بیندازید. اطمینان حاصل کنید که دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

FRAGMIN برای جلوگیری از لخته شدن (انعقاد) خون پس از اعمال جراحی، درمان مشکل حاد شکلگیری لخته‌های خونی در وریدهای عمقی، درمان لخته‌های خونی حاکی از علائم بیماری به منظور جلوگیری از عود لخته‌ها در بیماران سرطانی، درمان بیماری عروق کرونر ناپایدار، جلوگیری از تشکیل لخته در بیماران که به علت کاهش تحرک ناشی از بیماری‌های حاد در معرض خطر قرار دارند، و نیز برای جلوگیری از تشکیل لخته در تجهیزات تصفیه و دیالیز خون در ارتباط با نارسایی حاد کلیوی یا بیماری حاد کلیوی به کار می‌رود.

رعایت دقیق دستور پزشک یا پرستار الزامی است. تزریقات را طبق تجویز پزشک در کل دوره زمانی تجویز شده انجام دهید.

در مدت مصرف FRAGMIN، هیچ داروی دیگری به جز تجویز پزشک مصرف نکنید. از آنجا که برخی داروها ممکن است اثر ضدانعقادی (یا اثر رقیق کردن خون) FRAGMIN را تشدید کند، باید حتماً مصرف هر گونه داروی دیگری را به پزشک خود اطلاع دهید.

FRAGMIN از راه تزریق در زیر سطح پوست (تزریق زیرپوستی) مصرف می‌شود و نباید به صورت داخل عضلانی مصرف شود.

در صورت بروز مشکلات زیر، مصرف FRAGMIN را متوقف کنید: کبودی، درد یا تغییر رنگ شدید در اطراف محل تزریق؛ کبودی بدون علت مشخص؛ خونریزی بینی؛ خونریزی دهان، لثه‌ها، شکم، مقعد یا واژن؛ خونریزی محل تزریق یا محل جراحی؛ واکنش‌های حساسیتی؛ وجود خون در ادرار؛ یا سکنه مغزی (خونریزی مغزی). در صورت مشاهده هر گونه عوارض غیرمنتظره در مدت مصرف FRAGMIN، بلافاصله با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

سرنگ‌های آماده تزریق را در دمای اتاق نگهداری کنید (15 الی 30 درجه سانتی‌گراد).

لطفاً جهت کسب اطلاعات کامل درباره روش مصرف و ایمنی، به بروشور اطلاعات مصرف‌کننده در بسته‌بندی محصول رجوع کنید.

برای آشنایی با سایر منابع مفید در ارتباط با Fragmin، به وبسایت [Fragmin.ca](http://Fragmin.ca) رجوع کنید

جهت ورود به وبسایت، از این شماره استفاده کنید: 02430789