

Técnica de injeção

Como autoaplicar uma injeção de Fragmin usando a seringa de segurança pré-preenchida

NÃO tente remover a seringa da cartela com seus dedos.

Siga as instruções com a técnica de manuseio correta mostrada nos passos 1 a 3, caso contrário o mecanismo de segurança da agulha pode ser disparado, inutilizando a seringa.

PASSO 1

Remova totalmente o papel da parte traseira da cartela.



PASSO 2

Gire a embalagem para que o lado aberto fique voltado para baixo, de três a cinco centímetros sobre uma superfície nivelada, como uma mesa.



PASSO 3

Para liberar a seringa, puxe as laterais para fora a partir do meio da cartela para ampliar a cavidade da cartela. Isso deve fazer a seringa cair da cartela.



PASSO 4

Lave suas mãos.



PASSO 5

Escolha o local de injeção.

O local preferido de injeção é a parte inferior do abdômen. O FRAGMIN também pode ser injetado na lateral da coxa, tomando-se o devido cuidado para não injetar no tecido muscular. Selecione um local diferente no abdômen ou na coxa para cada injeção posterior, **conforme ilustrado**.



PASSO 6

Limpe o local.

Limpe a área selecionada para injeção com um chumaço embebido em álcool e deixe secar.



PASSO 7

Pegue a seringa pelo corpo e prepare-se para injetar a dose de FRAGMIN.

NÃO toque as presilhas de ativação da proteção da agulha em momento algum durante o uso. Isso pode disparar o mecanismo de segurança da agulha, fazendo a agulha se retrair (voltar) antes que a injeção seja aplicada. Isso inutilizará a seringa.



PASSO 8

Remova a proteção da agulha.

Observe que um puxão firme é necessário para remover a proteção da agulha. Para garantir a liberação da dose completa, **não remova nenhuma das pequenas bolhas de ar da seringa pré-preenchida antes da injeção.**



PASSO 9

Belisque uma dobra de pele.

A agulha tem de ser inserida na dobra de pele criada com o polegar e o indicador.

Essa dobra de pele deve ser mantida durante toda a injeção.



PASSO 10

Administre o FRAGMIN.

Usando sua mão dominante, segure a seringa como um lápis entre seu polegar e dedo médio. Insira a agulha verticalmente na dobra de pele o máximo possível. Depois de inserida, a agulha não deve ser movimentada.

Se estiver autoaplicando a injeção, pressione o êmbolo usando o dedo indicador; **se estiver injetando em outra pessoa**, use o polegar para pressionar o êmbolo.



PASSO 11

Remova a agulha e ative a proteção da agulha.

Quando você tiver injetado todo o conteúdo da seringa, remova a agulha **mantendo a dobra de pele e segurando o êmbolo para baixo, em seguida libere a pele.**

Solte o êmbolo e permita que a seringa suba para dentro do dispositivo até toda a agulha ficar protegida. **A proteção da agulha não será ativada até que toda a dose tenha sido administrada.**



PASSO 12

Depois que o FRAGMIN tiver sido administrado.

Pressione um pequeno chumaço de algodão no local da injeção por 5 a 10 segundos ou mais. Para evitar hematomas, não esfregue o local da injeção. Descarte a seringa usada em um recipiente aprovado. Mantenha a seringa fora do alcance de crianças.



FRAGMIN é utilizado para prevenir a formação de coágulos sanguíneos (coagulação) quando uma cirurgia é realizada, para tratar a formação aguda de coágulos sanguíneos nas veias profundas, para tratar coágulos sanguíneos sintomáticos para prevenir a recorrência dos coágulos em pacientes com câncer, para tratar doença arterial coronariana instável, para impedir a coagulação naqueles em risco quando a mobilidade é restrita durante uma doença aguda e para prevenir a coagulação em equipamentos de diálise e filtragem de sangue relacionados à insuficiência renal aguda ou doença renal crônica.

É necessário seguir atentamente as instruções de seu médico ou enfermeiro. Aplique você mesmo as injeções prescritas durante todo o período especificado por seu médico.

Não tome quaisquer medicamentos não prescritos pelo seu médico enquanto estiver tomando o FRAGMIN. Alguns medicamentos podem intensificar o efeito anticoagulante (por exemplo, efeito de afinamento do sangue) do FRAGMIN, por isso é importante que você fale com seu médico sobre quaisquer medicamentos que esteja tomando.

O FRAGMIN é administrado como uma injeção sob a superfície da pele (subcutaneamente) e não deve ser administrado de modo intramuscular.

Interrompa a administração de FRAGMIN e entre em contato com seu médico em caso de: descoloração grave, dor ou escoriações ao redor do local de injeção; escoriação sem causa aparente; sangramento nasal; sangramento pela boca, gengivas, abdômen, ânus ou vagina; sangramento no local de injeção ou de um local cirúrgico; reações alérgicas; sangue na urina; ou se experimentar um derrame (hemorragia cerebral). Em caso de quaisquer efeitos inesperados enquanto tomar o FRAGMIN, entre em contato com seu médico ou farmacêutico imediatamente.

Armazene suas seringas pré-preenchidas a temperatura ambiente (15 a 30 °C).

Consulte o folheto de Informações ao Consumidor no pacote do produto para obter informações completas sobre administração e segurança.

Visite Fragmin.ca para encontrar outros recursos úteis de Fragmin disponíveis em inglês e francês

Use este número para entrar no site: 02430789



FRAGMIN © Pfizer Health AB, owner/Pfizer Canada ULC, Licensee
© 2019 Pfizer Canada ULC, Kirkland, Quebec H9J 2M5

PP-FRA-CAN-0170-PG

