



# Técnica de inyección

## Cómo aplicarse una inyección de Fragmin mediante la jeringa de seguridad precargada

### **NO intente extraer la jeringa del envase alveolado con los dedos.**

Siga las instrucciones para aplicar la técnica de manipulación correcta como se muestra en los pasos 1 a 3, de lo contrario, el mecanismo de seguridad de la aguja puede dispararse, y la jeringa quedará inutilizable.

### PASO 1

Despegue por completo el papel protector del envase alveolado.



### PASO 2

Gire el envase de modo que el lado abierto quede hacia abajo, entre tres y cinco centímetros sobre una superficie plana, por ejemplo, una mesa.



### PASO 3

Para extraer la jeringa, separe los lados del envase alveolado haciendo presión en el medio para ensanchar la cavidad de este envase y lograr que la jeringa salga.



### PASO 4

Lávese las manos.



### PASO 5

**Elija el lugar donde se aplicará la inyección.**

El sitio adecuado para inyectarse es la parte inferior del abdomen. FRAGMIN también puede inyectarse en la parte lateral del muslo, siempre que se tenga cuidado de no aplicar la inyección en el tejido muscular. Elija un lado distinto del abdomen o el muslo para cada inyección subsiguiente, **como se muestra en la imagen.**



### PASO 6

**Limpié el sitio de inyección.**

Humedezca el sitio de inyección que eligió con una bolita de algodón con alcohol y deje secar.



### PASO 7

**Tome la jeringa por el cuerpo y prepárese para inyectar la dosis de FRAGMIN.**

**Durante el uso, NO toque las pinzas de activación protectoras de la aguja en ningún momento. Esto puede disparar el mecanismo de seguridad de la aguja y hacer que la aguja se retire (retroceda) antes de la aplicación de la inyección. Si esto sucede, la jeringa quedará inutilizable.**



### PASO 8

**Retire la cubierta de la aguja.**

Tenga en cuenta que debe jalar firmemente para retirar la cubierta de la aguja. Para asegurarse de administrar la dosis completa, **no elimine las burbujas de aire pequeñas de la jeringa precargada antes de la inyección.**



## PASO 9

### Pellizque un pliegue de piel.

La aguja debe insertarse en el pliegue de piel que creó con los dedos pulgar e índice. **Sostenga este pliegue de piel durante toda la administración de la inyección.**



## PASO 10

### Administre la inyección de FRAGMIN.

Con la mano dominante, sostenga la jeringa como si fuera un lápiz, entre el dedo pulgar y el dedo del medio. Inserte la aguja verticalmente en el pliegue de piel hasta llegar al tope. Una vez que la haya insertado, no la mueva.



**Si se está aplicando la inyección usted mismo**, presione el émbolo con el dedo índice; **si le está aplicando la inyección a otra persona**, presione el émbolo con el dedo pulgar.

## PASO 11

### Retire la aguja y active la cubierta de la aguja.

Una vez que haya inyectado todo el contenido de la jeringa, retire la aguja **manteniendo la piel plegada y presionando el émbolo; luego, suelte la piel.**



Suelte el émbolo para que la jeringa se mueva hacia el interior del dispositivo hasta que toda la aguja quede en la cubierta. **La cubierta de la aguja no se activará hasta que se haya administrado la dosis completa.**

## PASO 12

### Después de administrar FRAGMIN:

Presione un trozo de algodón sobre el sitio de la inyección durante 5 o 10 segundos o más. Para evitar los hematomas, no frote el sitio donde se aplicó la inyección.



Deseche la jeringa usada en un recipiente aprobado. Asegúrese de que esté fuera del alcance de los niños.

FRAGMIN se utiliza como anticoagulante cuando se realiza una cirugía, para tratar la formación aguda de coágulos de sangre en las venas profundas, para tratar coágulos de sangre sintomáticos a fin de evitar la recurrencia de coágulos en pacientes que padecen cáncer, para tratar la arteriopatía coronaria inestable, para evitar la formación de coágulos en personas en riesgo cuando la movilidad se ve restringida durante una enfermedad grave y para evitar la coagulación en equipos de hemodiálisis y filtración de sangre en relación con la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica.

**Es necesario que siga las instrucciones de su médico o enfermero con cuidado. Aplíquese las inyecciones indicadas durante todo el período especificado por su médico.**

**Mientras recibe FRAGMIN, no tome ningún otro medicamento que no sea el que le haya recetado el médico.** Como ciertos medicamentos pueden intensificar el efecto anticoagulante (por ejemplo, el efecto de dilución de la sangre) de FRAGMIN, es importante que le informe a su médico sobre los medicamentos que esté tomando.

**FRAGMIN se administra en forma de inyección debajo de la superficie de la piel (por vía subcutánea) y no debe administrarse por vía intramuscular.**

**Deje de administrarse FRAGMIN y comuníquese con su médico** si experimenta: decoloración intensa; dolor o hematomas alrededor del sitio de la inyección; hematomas sin causa aparente; hemorragia nasal; sangrado en la boca, las encías, el abdomen, el ano o la vagina; sangrado en el sitio de la inyección o en el sitio quirúrgico; reacciones alérgicas; sangre en la orina o accidente cerebrovascular (hemorragia cerebral). Si tiene efectos inesperados mientras recibe FRAGMIN, comuníquese con su médico o farmacéutico de inmediato.

Almacene las jeringas precargadas a temperatura ambiente (entre 15 °C y 30 °C).

Consulte el prospecto para el consumidor que viene en el envase del producto, para obtener información completa sobre administración y seguridad.

**Visite [Fragmin.ca](http://Fragmin.ca) para acceder a otros recursos valiosos de Fragmin disponibles en inglés y francés**

**Use este número para ingresar al sitio web: 02430789**



FRAGMIN © Pfizer Health AB, owner/Pfizer Canada ULC, Licensee  
© 2019 Pfizer Canada ULC, Kirkland, Quebec H9J 2M5

PP-FRA-CAN-0170-SP

