

پریفِلڈ حفاظتی سرنج کا استعمال کر کے اپنے آپ کو FRAGMIN انجیکشن دینے کا طریقہ

اپنی اُنگلیوں کی مدد سے بلسٹر پیکیجنگ سے سرنج نکالنے کی کوشش نہ کریں۔

استعمال کے درست طریقہ کو جاننے کے لیے مرحلہ 1 سے 3 تک دکھائے گئے طریقہ کے مطابق ہدایات پر عمل کریں، ورنہ سوئی کا حفاظتی میکانیزم حرکت میں آسکتا ہے، جس کے نتیجہ میں سرنج ناقابل استعمال ہو سکتا ہے۔



مرحلہ 2

پیکیجنگ کو گھمائیں تاکہ کھلا ہوا کنارہ نیچے کے رخ پر ہموار سطح جیسے میز سے تین تا پانچ سٹی میٹر اوپر ہو۔



مرحلہ 1

بلسٹر پیکیجنگ سے کاغذی لفافے کو مکمل طور پر نکالیں۔



مرحلہ 4

اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔



مرحلہ 3

سرنج کو نکالنے کے لیے، بلسٹر پیکیجنگ کے کناروں کو اس کے درمیانی حصے سے کھینچیں تاکہ بلسٹر کا خانہ پھیل جائے۔ اس کے نتیجہ میں سرنج بلسٹر سے باہر آجائے گا۔



مرحلہ 6

اس جگہ کو صاف کریں۔

انجیکشن کے لیے منتخب کردہ حصے کو الکحل کے پھابے سے پونچھیں اور اس کو خشک ہوجانے دیں۔



مرحلہ 5

انجیکشن کی جگہ منتخب کریں۔

انجیکشن لگوانے کی ترجیحی جگہ شکم کا نچلا حصہ ہے۔ FRAGMIN کو جانگھ کی بغل میں بھی لگایا جا سکتا ہے، بشرطیکہ یہ احتیاط برتی جائے کہ انجیکشن کو عضلہ کی نسیج میں لگایا جائے۔ اس کے بعد والے ہر انجیکشن کے لیے شکم یا ران پر ایک مختلف جگہ منتخب کی کریں، جیسا کہ تصویر میں بتایا گیا ہے۔



مرحلہ 8

سوئی کے خول کو نکالیں۔

براہ کرم اس بات کو نوٹ کریں کہ سوئی کے خول کو نکالنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھینچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوری خوراک جسم کے اندر جانے کو یقینی بنانے کے لیے، انجیکشن دیے جانے سے قبل، پریفیلڈ سرنج سے ہوا کے کسی چھوٹے بلبوں کو خارج نہ کریں۔



مرحلہ 7

سرنج کا درمیانی حصہ پکڑ کر اسے اُٹھائیں اور FRAGMIN کی خوراک کا انجیکشن دینے کے لیے تیار کریں۔

استعمال کے دوران کسی بھی وقت سوئی کے حفاظتی ایکٹیویشن کاپس کو نہ چھوئیں۔ اس سے سوئی کا

حفاظتی میکانیزم حرکت میں آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے انجیکشن دیے جانے سے پہلے ہی سوئی واپس نکل (باہر کھینچ) سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے سرنج ناقابل استعمال ہو جائے گا۔

مرحلہ 9

جلد کی ایک تپہ کو چٹکی

میں پکڑیں۔

سوئی کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے ذریعہ بنائی ہوئی جلد کی تپہ کے اندر داخل کیا جائے۔ انجیکشن کے عمل کے دوران جلد کی اس تپہ کو برقرار رکھا جائے۔



مرحلہ 10

FRAGMIN دیں۔

اپنے غالب طور پر مستعمل ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے سرنج کو انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے بیچ پینسل کی طرح پکڑیں۔ سوئی کو عمودی طور پر جلد کی تپہ میں ممکنہ حد تک گہرائی میں داخل کریں۔ سوئی کو داخل کرنے کے بعد اس کو حرکت نہیں دینا چاہیے۔

اگر آپ خود کو انجیکشن دے رہے ہیں تو، شہادت کی انگلی کا استعمال کرتے ہوئے سرنج کے پلنجر (متحرک حصہ) کو دبائیں؛ اگر آپ کسی اور کو انجیکشن دے رہے ہیں تو، پلنجر کو دبانے کے لیے انگوٹھے کو استعمال کریں۔



مرحلہ 12

FRAGMIN دیے جانے کے بعد۔

روئی کے گولے کو انجیکشن کی جگہ پر 5 تا 10 سیکنڈز یا اس سے زیادہ دیر تک دبائے رکھیں۔ خراش سے بچنے کے لیے انجیکشن کی جگہ پر رگڑیں نہیں۔

استعمال شدہ سرنج کو ایک منظورہ شدہ کنٹینر میں ضائع کریں۔ یقینی بنائیں کہ اسے بچوں کی پہنچ سے دور رکھا گیا ہے۔



مرحلہ 11

سوئی کو نکالیں اور سوئی کے گارڈ کو فعال کریں۔

سرنج کے اندر موجود پورا مواد انجیکشن کے ذریعہ داخل کیے جانے کے بعد، جلد کی تپہ کو بحال رکھتے ہوئے اور پلنجر کو نیچے کی طرف دبائے رکھ کر سوئی کو نکالیں، اس کے بعد جلد کو چھوڑ دیں۔

پوری سوئی کے محفوظ ہونے تک، پلنجر کو چھوڑ دیں اور سرنج کو آلہ کے اندر اوپر کی جانب حرکت کرنے دیں۔ جب تک دوا کی پوری خوراک جسم کے اندر داخل نہ ہو جائے تب تک کا گارڈ فعال نہیں ہوگا۔

FRAGMIN کوسرجری کی انجام دہی کے بعد خون کے انجماد (خون بستگی) کو روکنے کے لیے، رگوں کی گہرائی میں خون کے چکتوں کی شدید تشکیل کے علاج کے لیے، کینسر کے مریضوں میں خون کے چکتوں کی تشکیل کے اعادہ کو روکنے کے لیے اور ناپائیدار اکیلی عروقی بیماری کا علاج کرنے کے لیے، شدید بیماریوں میں حرکت محدود ہونے کے دوران، خطرہ کی زد والے مریضوں میں خون کے چکتوں کی تشکیل کو روکنے کے لیے، اور گردے کی شدید خرابی یا گردے کی کرائیک بیماری کے سلسلے میں خون کے ڈائلیسس اور عمل تقطیر کے آلات میں خون میں چکتوں کی تشکیل کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

آپ کو اپنے ڈاکٹر یا نرس کی ہدایات پر پوری احتیاط کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنے ڈاکٹر کے ذریعہ صراحت کردہ پوری مقررہ مدت تک کے لیے تجویز کردہ انجیکشن اپنے آپ کو لگائیں۔ ربر کی نڈل کی شیلڈ میں لیٹکس ہو سکتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر یا دوا فروش سے بات کریں اگر آپ کو لیٹکس (قدرتی ربر) کے تئیں پہلے بیش حساسیت رہ چکی ہو یا ابھی لاحق ہو۔

FRAGMIN لینے کی مدت کے دوران، اپنے ڈاکٹر کے ذریعہ تجویز کردہ دواؤں کے علاوہ کوئی اور دوا نہ لیں۔ چونکہ چند مخصوص دوائیں، FRAGMIN کے انجماد مخالف اثرات (مثلاً خون کے پتلا ہونے کا اثر) میں شدت پیدا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ بات اہم ہے کہ آپ جو کوئی دوائیں لے رہے ہیں ان کے متعلق اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔

FRAGMIN کو جلد کی سطح کے نیچے (زیر جلد طور پر) ایک انجیکشن کے طور پر دیا جاتا ہے، اور اس کو درون عضلاتی طور پر نہیں دینا چاہیے۔

اگر آپ کو انجیکشن کی جگہ کے اطراف رنگت کی شدید بدھائی، درد، یا خراش؛ یا کسی ظاہری وجہ کے بغیر خراش؛ نکسیر (ناک سے خون بہنا)، منہ، مسوڑھوں، شکم، مقعد یا اندام نہانی سے جریان خون؛ انجیکشن کی جگہ پر یا سرجری والی جگہ سے جریان خون؛ الرجی زا ردعمل، پیشاب میں خون کا سامنا ہو یا اگر آپ کو فالج (دماغ کے اندر جریان خون) کا سامنا ہو تو، FRAGMIN لینا روک دیں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ FRAGMIN لینے کے دوران، کسی بھی غیر متوقع اثرات کے لیے، فوری طور پر اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے رابطہ کریں۔

اپنے پریفیلڈ سرنجوں کو کمرے کی درجہ حرارت (15 تا 30 ڈگری سیلسیٹس) پر رکھیں۔

دوا دینے اور حفاظت سے متعلق مکمل معلومات کے لیے، براہ کرم مصنوع کے پیکج کے اندر موجود گاہک کے معلوماتی پرچہ سے رجوع کریں۔

انگریزی اور فرانسیسی میں دستیاب دیگر معاون فریگمین (Fragmin) وسائل کی تلاش کے لیے Fragmin.ca ملاحظہ فرمائیں

ویب سائٹ میں داخل ہونے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں: 02430789



FRAGMIN © Pfizer Health AB, owner/ Pfizer Canada ULC, Licensee
© 2022 Pfizer Canada ULC, Kirkland, Quebec H9J 2M5

PP-FRA-CAN-0267-UR

