



Técnica de injeção



Como autoaplicar uma injeção de Fragmin usando a seringa de segurança pré-preenchida

NÃO tente remover a seringa da cartela com seus dedos.

Siga as instruções com a técnica de manuseio correta mostrada nos passos 1 a 3, caso contrário o mecanismo de segurança da agulha pode ser disparado, inutilizando a seringa.

PASSO 1

Remova totalmente o papel da parte traseira da cartela.



PASSO 2

Gire a embalagem para que o lado aberto fique voltado para baixo, de três a cinco centímetros sobre uma superfície nivelada, como uma mesa.



PASSO 3

Para liberar a seringa, puxe as laterais para fora a partir do meio da cartela para ampliar a cavidade da cartela. Isso deve fazer a seringa cair da cartela.



PASSO 4

Lave suas mãos.



PASSO 5

Escolha o local de injeção.

O local preferido de injeção é a parte inferior do abdômen. O FRAGMIN também pode ser injetado na lateral da coxa, tomando-se o devido cuidado para não injetar no tecido muscular. Selecione um local diferente no abdômen ou na coxa para cada injeção posterior, **conforme ilustrado**.



PASSO 6

Limpe o local.

Limpe a área selecionada para injeção com um chumaço embebido em álcool e deixe secar.



PASSO 7

Pegue a seringa pelo corpo e prepare-se para injetar a dose de FRAGMIN.

NÃO toque as presilhas de ativação da proteção da agulha em momento algum durante o uso. Isso pode disparar o mecanismo de segurança da agulha, fazendo a agulha se retrair (voltar) antes que a injeção seja aplicada. Isso inutilizará a seringa.



PASSO 8

Remova a proteção da agulha.

Observe que um puxão firme é necessário para remover a proteção da agulha. Para garantir a liberação da dose completa, **não remova nenhuma das pequenas bolhas de ar da seringa pré-preenchida antes da injeção.**



PASSO 9

Belisque uma dobra de pele.

A agulha tem de ser inserida na dobra de pele criada com o polegar e o indicador.

Essa dobra de pele deve ser mantida durante toda a injeção.



PASSO 10

Administre o FRAGMIN.

Usando sua mão dominante, segure a seringa como um lápis entre seu polegar e dedo médio. Insira a agulha verticalmente na dobra de pele o máximo possível. Depois de inserida, a agulha não deve ser movimentada.



Se estiver autoaplicando a injeção, pressione o êmbolo usando o dedo indicador; **se estiver injetando em outra pessoa**, use o polegar para pressionar o êmbolo.

PASSO 11

Remova a agulha e ative a proteção da agulha.

Quando você tiver injetado todo o conteúdo da seringa, remova a agulha **mantendo a dobra de pele e segurando o êmbolo para baixo, em seguida libere a pele.**

Solte o êmbolo e permita que a seringa suba para dentro do dispositivo até toda a agulha ficar protegida. **A proteção da agulha não será ativada até que toda a dose tenha sido administrada.**



PASSO 12

Depois que o FRAGMIN tiver sido administrado.

Pressione um pequeno chumaço de algodão no local da injeção por 5 a 10 segundos ou mais. Para evitar hematomas, não esfregue o local da injeção. Descarte a seringa usada em um recipiente aprovado. Mantenha a seringa fora do alcance de crianças.



FRAGMIN é utilizado para prevenir a formação de coágulos sanguíneos (coagulação) quando uma cirurgia é realizada, para tratar a formação aguda de coágulos sanguíneos nas veias profundas, para tratar coágulos sanguíneos sintomáticos para prevenir a recorrência dos coágulos em pacientes com câncer, para tratar doença arterial coronariana instável, para impedir a coagulação naqueles em risco quando a mobilidade é restrita durante uma doença aguda e para prevenir a coagulação em equipamentos de diálise e filtragem de sangue relacionados à insuficiência renal aguda ou doença renal crônica.

É necessário seguir atentamente as instruções de seu médico ou enfermeiro. Aplique você mesmo as injeções prescritas durante todo o período especificado por seu médico.

A tampa da agulha de borracha pode conter látex. Fale com seu médico ou farmacêutico se já teve ou tem atualmente uma hipersensibilidade ao látex (borracha natural).

Não tome quaisquer medicamentos não prescritos pelo seu médico enquanto estiver tomando o FRAGMIN. Alguns medicamentos podem intensificar o efeito anticoagulante (por exemplo, efeito de afinamento do sangue) do FRAGMIN, por isso é importante que você fale com seu médico sobre quaisquer medicamentos que esteja tomando.

O FRAGMIN é administrado como uma injeção sob a superfície da pele (subcutaneamente) e não deve ser administrado de modo intramuscular.

Interrompa a administração de FRAGMIN e entre em contato com seu médico em caso de: descoloração grave, dor ou escoriações ao redor do local de injeção; escoriação sem causa aparente; sangramento nasal; sangramento pela boca, gengivas, abdômen, ânus ou vagina; sangramento no local de injeção ou de um local cirúrgico; reações alérgicas; sangue na urina; ou se experimentar um derrame (hemorragia cerebral). Em caso de quaisquer efeitos inesperados enquanto tomar o FRAGMIN, entre em contato com seu médico ou farmacêutico imediatamente.

Armazene suas seringas pré-preenchidas a temperatura ambiente (15 a 30 °C).

Consulte o folheto de Informações ao Consumidor no pacote do produto para obter informações completas sobre administração e segurança.

Visite Fragmin.ca para encontrar outros recursos úteis de Fragmin disponíveis em inglês e francês

Use este número para entrar no site: 02430789



FRAGMIN © Pfizer Health AB, owner/ Pfizer Canada ULC, Licensee
© 2021 Pfizer Canada ULC, Kirkland, Quebec H9J 2M5

PP-FRA-CAN-0267-PG

